



Nytt om legemidler

Risiko for selvmordstanker ved bruk av finasterid mot hårtap og forstørret prostata.



Menn som bruker finasterid i behandling av hårtap skal få bedre informasjon om mulige psykiske bivirkninger, inkludert risiko for selvmordstanker. Pakningsvedlegget blir oppdatert, og pakningene vil inneholde et pasientkort som minner om risikoen.



Finasterid 1 mg brukes mot hårtap hos menn og finasterid 5 mg mot forstørret prostata. I 2024 var det over 22 000 menn i Norge som fikk behandling med finasterid.

Gjennomgang av bivirkningsmeldinger

En gjennomgang av bivirkningsmeldinger gjort av europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) bekrefter mistanken om økt risiko for selvmordstanker ved bruk av finasteridtabletter (1). De fleste meldingene var knyttet til styrken 1 mg som brukes i behandling av hårtap.

En advarsel om humørendringer, inkludert depresjon, nedstemthet og selvmordstanker, er allerede inkludert i produktinformasjonen. EMA anbefaler likevel å styrke advarslene om potensielle psykiske bivirkninger for pasienter som bruker finasterid mot hårtap.

Dutasterid er et annet virkestoff som brukes i behandling av forstørret prostata, men virker på samme måte som finasterid. Det er ikke funnet tilsvarende sammenheng mellom selvmordstanker og dutasterid, men EMA anbefaler likevel som et føre-var-tiltak at produktinformasjonen oppdateres med samme advarsler.

Råd til leger

Et kjære helsepersonell-brev med informasjon om sikkerhetsoppdateringen sendes til leger.

- Informer pasienter som bruker finasterid 1 mg mot androgen alopeci om risiko for nedstemthet, depresjon og selvmordstanker. Ved slike symptomer bør behandlingen avbrytes og lege kontaktes.
- Oppfordre pasienter til å kontakte lege dersom de opplever tegn på seksuell dysfunksjon. Vurder om behandlingen bør seponeres.
- Finasterid 5 mg bør ikke forskrives "off-label" til behandling av hårtap.

Rosuvastatin - flere indikasjoner innvilget forhåndsgodkjent refusjon

Rosuvastatin har fått forhåndsgodkjent refusjon for indikasjonene primær hyperkolesterolemi eller kombinert dyslipidemi/hyperlipidemi eller profylakse mot alvorlige kardiovaskulære hendelser.

For alle indikasjoner gjelder følgende vilkår:

«Alle pasienter med behov for medikamentell lipidsenkende behandling skal bruke simvastatin eller atorvastatin med mindre andre refusjonsberettigede lipidsenkende legemidler må brukes av tungtveiende medisinske grunner. Dette må i så fall begrunnes i journalen».

Vydura – nytt behandlingsalternativ ved migreneanfall innvilget forhåndsgodkjent refusjon

Vydura (rimegepant) er en oral CGRP-hemmer i smeltetablettform, og det første legemiddelet i sin klasse med forhåndsgodkjent refusjon for akutt behandling av migrene. Refusjonen gjelder voksne pasienter som enten ikke har hatt tilstrekkelig effekt av minst tre ulike triptaner, eller som av medisinske grunner ikke kan bruke triptaner.

Det er kun anfallsbehandling med Vydura som kan forskrives på blå resept. Forebyggende behandling med Vydura dekkes ikke.

Referanse:

1. <https://www.dmp.no/nyheter/risiko-for-selvordstanker-ved-bruk-av-legemidler-mot-hartap-og-forstorret-prostatade>