



Nytt om legemidler

Ny styrke på Rybelsus tabletter. Vilkår for individuell stønad for Ozempic til behandling av diabetes type 2.



Legemiddelfirmaet Novo Nordisk bytter styrker på Rybelsus tablettene (1). De nye tablettene med lavere styrker har samme virkning og sikkerhet som de opprinnelige. I en overgangsperiode, der både nye og gamle tabletter er tilgjengelige, kan det oppstå misforståelser.



Om lag 700 pasienter bruker Rybelsus, som inneholder virkestoffet semaglutid, og brukes til å behandle voksne med type 2-diabetes.

Rybelsus tas som én tablett per dag og kan brukes alene, eller i kombinasjon med andre legemidler. Feildosering med for høy dose av virkestoffet semaglutid kan føre til kvalme, oppkast og diaré.

Lavere styrker

De opprinnelige pakningene med tabletter på 3 mg, 7 mg og 14 mg blir byttet ut med nye tabletter med styrker på 1,5 mg, 4 mg og 9 mg. De nye tablettene er mindre og har rund form. De nye eskene vil også være mindre.

Tabletter med både nye og opprinnelige formuleringer vil i en overgangsperiode være tilgjengelig på apotek. Informer pasienter som har resept på de opprinnelige tablettene at de vil kunne få utdelt pakning med ny styrke på apotek.

Forskriv nye tabletter

Velg tabletter med nye styrkeangivelser når du forskriver Rybelsus til pasienter som skal starte behandlingen. Pasienter som har brukt de gamle tablettene må få grundig informasjon når ny styrke forskrives.

Det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til allmennleger, endokrinologer, kardiologer, farmasøyer/ apotek og diabetessykepleiere for å informere om ny styrke på tablettene, og redusere risikoen for feilbruk. Brevet inneholder bilder som viser forskjellen på nye og gamle tabletter og pakninger (1).

Referanser:

1. <https://www.dmp.no/nyheter/rybelsus-ny-styrke>
2. <https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-sto-nad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-til--5-14-legemiddellisten/virkestoffer/semaglutid-2>

Ozempic (semaglutid) og refusjon

Vilkår for individuell stønad

Ozempic skal brukes sammen med metformin eller sulfonylurea (for eksempel glimepirid) eller insulin (2).

Individuell stønad gis ikke for Ozempic:

- som eneste diabeteslegemiddel (monoterapi)
- hvis ikke pasienten samtidig behandles med metformin, sulfonylurea (for eksempel glimepirid) eller insulin
- i kombinasjon med SGLT2-hemmer, for eksempel Forxiga og Jardiance, når SGLT2-hemmeren brukes til behandling av diabetes type 2.

Krav om tidligere behandling

Minst ett av legemidlene, metformin, sulfonylurea eller insulin, skal være forsøkt i høyeste tolererbare dose uten å ha oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll.

I søknaden må legen oppgi en vurdering av minst ett av legemidlene nevnt over.